

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

婦人薬

喜谷実母散

喜谷実母散、ジツボンS 製造販売元

株式会社 キタニ

## 特徴

喜谷実母散は永年にわたり、女性保健薬として多くの方々に愛用されております。精選された生薬をバランスよく配合することにより、更年期障害や冷え症等、女性特有の諸症状にすぐれた効果をあらわします。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振

- しばらく服用しても症状がよくなる場合。

## 成分及び分量

本品は1包中下記の成分を含有する。

(日局) トウキ……………2.25g	(日局) バクジュツ…0.75g
// センキュウ……………2.25g	// オウゴン……………0.75g
// センコツ……………1.12g	// チョウジ……………0.56g
// モッコウ……………1.12g	// オウレン……………0.38g
// ケイヒ……………0.94g	// カンゾウ……………0.19g
// ピンロウジ……………0.94g	1包……………11.25g

## 効能又は効果

更年期障害、\*血の道症、月経不順、冷え症

およびそれらに随伴する次の諸症状：

月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしげ、血色不良、便秘、むくみ

### ※【血の道症】

「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安や、いらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことです。

(裏面をお読みください)

## 用法及び用量

大人1日1包を次のようにして4回服用します。

1回目及び2回目は、約1合(180ml)の熱湯を加えて振り出し、朝昼の食前に温服します。


3回目及び4回目は、水1合5勺(270ml)を加え半量に煎じつめたものを、夕食前及び就寝前に分けて温服します。

### ○1包を次のようにして服用してください。

1回目：熱湯180ml(大きめの茶碗1杯)に1包を浸し、適当な濃さに振り出して朝食前に服用します。

2回目：1回目に使用した実母散を同じように振り出して昼食前に服用します。

3回目、4回目：2回目に使用した実母散に水270mlを加え、半量まで煎じつめ、夕食前及び就寝前に分けて服用します。



## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※1包はその日のうちに服用してください。

※振り出し後又は煎じた後、容器の底に沈殿物があっても、そのまま服用して差支えありません。

※生薬を原料として製造しているため、製品の色や味等に多少の差異が生じることがありますが、効果には変わりありません。

## 包装

5日分(5包入)・10日分(10包入)・30日分(30包入)

●実母散には多くの種類がございます。お買い求めの節には「喜谷実母散」とご指定ください。

喜谷実母散の他にも下記製品があります。  
ジツボンS……………120錠、240錠、480錠

## お客様相談窓口

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または、下記までお願いいたします。

株式会社 キタニ お客様相談室

電話 03-3716-2161

電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)午前9時～午後5時

喜谷実母散、ジツボンS 製造販売元

株式会社 キタニ

〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-5-3